

# Maladie de la tête noire : recommandations de pratiques exemplaires



La maladie de la tête noire, aussi appelée histomonose, est une maladie causée par le parasite *Histomonas meleagridis*. Comme il n'existe actuellement aucun vaccin ou traitement approuvé pour une utilisation sous licence au Canada, il est extrêmement important d'avoir de bonnes pratiques de biosécurité pour limiter l'introduction et la propagation du parasite *Histomonas* dans le troupeau.

## La biosécurité est essentielle

- Pratiquez une bonne hygiène des mains. Lavez ou désinfectez vos mains avant d'entrer dans le poulailler et lorsque vous en sortez.
- Portez une combinaison et des bottes propres et réservées à chaque visite du poulailler.
- Mettez en place un solide programme de contrôle des rongeurs.
- Procédez à la visite des poulaillers du plus jeune au plus vieux troupeau (ou du plus sain au plus malade).
- Assurez-vous que le personnel externe (p. ex., l'équipe de capture/nettoyage) suit les mêmes protocoles de biosécurité relativement à l'équipement de protection individuelle et au lavage des mains.
- Restreignez les visiteurs extérieurs dans la mesure du possible.



## Temps d'arrêt entre les troupeaux

- Prévoyez un temps d'arrêt d'au moins deux semaines entre les troupeaux pour le nettoyage à sec de chaque poulailler.
- « Nettoyage à sec » signifie que le poulailler est complètement nettoyé, désinfecté et séché.



## Équipement et machinerie

- N'utilisez pas l'équipement ou la machinerie d'une autre ferme d'élevage, particulièrement si elle compte plus d'une espèce de volaille.
- L'équipement et la machinerie doivent être entreposés à l'intérieur.
- N'utilisez pas d'équipement et de machinerie ayant été utilisés à l'extérieur (par exemple, un rotoculteur).
- Nettoyez et désinfectez toujours la machinerie et l'équipement avant de les utiliser dans le poulailler.




## Lutte contre les insectes

- Suivez les instructions de l'étiquette pour une utilisation appropriée des pesticides.
- Utilisez en alternance différentes catégories de pesticides à chaque cycle.
- Procédez à l'épandage ciblé de pesticides sur les bords et les poutres du poulailler avant le placement des oiseaux.
- Épandez du sel et des pesticides sur le pourtour du poulailler pour empêcher les vers de terre et les insectes d'y entrer.



## Gestion de la litière

- Ne réutilisez pas la même litière d'un troupeau à l'autre ni de litière contaminée.
- N'entreposez pas les copeaux sur place.
- Retirez complètement la litière à chaque étape (pas seulement dans les couveuses).
- Enlevez tout le fumier après une purge complète, et lavez à pression tout le poulailler vide. Le plancher de béton doit être entièrement séché et/ou traité à la chaleur avant l'épandage de copeaux frais.



## Élevage

- Créez un programme de vermifugation systématique avec votre vétérinaire pour favoriser la santé intestinale des oiseaux.
- Réduisez le stress chez les oiseaux (par exemple, interruption de l'alimentation lors d'une panne de courant, pas de litière dans les bacs d'alimentation, baisse de la concentration de CO2 dans le poulailler – devrait idéalement se situer sous la barre de 2 500 ppm).
- Réduisez dans la mesure du possible le stress causé par le froid ou la chaleur.
- Réduisez le temps entre le placement des aliments et celui des oiseaux.



## Entretien et réparation du poulailler

- Les fissures et les crevasses sur les planchers et les murs du poulailler doivent être régulièrement colmatées et scellées.
- Les ouvertures dans les entrées de porte doivent être correctement bouchées pour empêcher la vermine et les insectes d'entrer dans le poulailler.
- Construisez des cloisons près des portes du poulailler pour prévenir les courants d'air ou pour empêcher les oiseaux de manger des vers de terre ou des insectes à l'extérieur.



## Que faire si vous soupçonnez la présence de la maladie de la tête noire

- Appelez votre vétérinaire dès que possible si les oiseaux semblent malades. Votre vétérinaire peut effectuer une nécropsie et/ou faire parvenir des échantillons au laboratoire de Santé animale Canada pour établir un diagnostic de confirmation de la maladie de la tête noire.
- Procédez à l'enlèvement rapide et à l'élimination appropriée des oiseaux morts et de la litière contaminée à l'extérieur de la ferme.
- Pratiquez une bonne hygiène des mains après avoir manipulé des oiseaux morts ou malades.
- Assurez-vous que les machines et l'équipement utilisés pour manipuler les oiseaux morts ou malades sont nettoyés et désinfectés.
- Écartez les oiseaux qui semblent léthargiques.
- Déplacer le troupeau vers un poulailler dont la litière est propre (ou épandez une couche de litière fraîche si le déplacement des oiseaux n'est pas possible).



Pour en savoir plus sur la maladie de la tête noire ou sur le programme, envoyez un courriel à [m.benoite@bcturkey.com](mailto:m.benoite@bcturkey.com) ou consultez le site <http://www.bcturkey.com>