

Tique asiatique à longues cornes

Les bagueurs d'oiseaux peuvent aider à détecter rapidement l'apparition de nouvelles espèces de tiques.

Vérifiez, collectez et signalez les tiques en toute sécurité.

Les oiseaux migrateurs peuvent transporter les tiques sur de longues distances. On peut trouver des larves et des nymphes sur les oiseaux et les petits mammifères. Les stations de baguage des oiseaux sont idéalement situées pour contribuer à la détection précoce et à la surveillance.



Étapes de prélèvement:

1. Portez des gants lorsque vous manipulez des oiseaux et des tiques.
2. Inspectez-les rapidement et délicatement lors des manipulations de routine autorisées.
3. Retirez soigneusement les tiques accrochées à l'aide d'une pince à la pointe fine.
4. Placez chaque tique dans un flacon étiqueté ou un récipient hermétique, puis mettez-le au congélateur pendant la nuit.
5. Notez l'espèce hôte, la localisation géographique, la date et les informations relatives à la personne ayant prélevé la tique.
6. Transmettez ces informations via votre dispositif provincial ou local de surveillance des tiques ou via une plateforme d'identification par photo, le cas échéant.



Site de soumission eTick
et ressources

Les tiques asiatiques à longues cornes (TALC) sont très petites, de la taille d'une graine de chia, de couleur brun rougeâtre, et peuvent passer inaperçues.


Inspectez attentivement ces zones clés:

la tête, les yeux
et le bec

les oreilles

le cou

sur et sous les
ailes



N'écrasez pas les tiques à mains nues.

N'appliquez pas de pesticides, de répulsifs, d'alcool, d'huiles ou de chaleur sur les oiseaux.

Ne retardez pas la remise en liberté des oiseaux au-delà des protocoles habituels de bien-être animal.

Ne communiquez pas l'espèce de tique à moins qu'elle n'ait été confirmée par un expert.

