
RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 2 novembre 2026 au 8 novembre 2026


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)

Influenza aviaire hautement pathogène


- Une mise à jour de l'USDA indique que le séquençage du génome entier confirme la présence du génotype B3.13 du virus H5N1 chez des bovins laitiers dans **l'État de Washington** ; des éléments suggèrent une introduction depuis **l'Idaho**, liée aux déplacements de bétail — *Pour en savoir plus*




- Au 9 novembre 2026, l'USDA a signalé la présence du virus de la grippe A(H5N1) dans 1 230 troupeaux laitiers répartis dans 21 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Indiana (2), Oklahoma (2), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Washington (43), Texas (43), Colorado (64), Idaho (177) et Californie (773). De nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine écoulée dans **l'État de Washington** (3) et au **Texas** (2) — *Pour en savoir plus*



- Au cours de la semaine dernière, le **Canada** a confirmé des foyers d'IAHP dans des élevages de volailles commerciaux en **Colombie-Britannique** (1) et au **Québec** (1) ; dans des élevages de volailles non commerciaux en **Alberta** (2) ; ainsi que chez des oiseaux non classés comme volailles (non commerciaux) en **Alberta** (1). Il s'agit des premières détections de la vague automnale au **Québec** et en **Colombie-Britannique** — *Pour en savoir plus*




- Le **Mexique** a confirmé son premier foyer d'IAHP H5N1 depuis mai 2024, au sein d'un élevage commercial comptant 225 860 poules pondeuses, situé à **Umán**, dans **l'État du Yucatán** — *Pour en savoir plus*




Myiase a Cochliomyia hominivorax

- Au 9 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 124 cas de MCH chez des animaux dans trois États : le **Texas** (79), le **Nouveau-Mexique** (40) et **l'Arizona** (5) ; le **Texas** a signalé son cas le plus septentrional à ce jour, chez des bovins dans le comté de **Mitchell**, ainsi qu'un second cas chez un animal sauvage (un wapiti) — *Pour en savoir plus*




Virus Shamonda

- Pré-impression : *"An Emerging Viral Infection in Horses in Central Europe: Suspected Shamonda Virus Seroconversion in Asymptomatic Horses in **Baden-Württemberg** from June to September 2026"* — *Pour en savoir plus*
  - Une étude rétrospective menée en **Allemagne** sur 11 chevaux cliniquement sains a révélé une séroconversion vis-à-vis des virus du sérogroupe Simbu entre juillet et août-septembre 2026, à la suite de l'émergence du virus Shamonda en Europe centrale. Tous les chevaux ont développé des anticorps tout en demeurant asymptomatiques, ce qui indique que la séropositivité n'est pas nécessairement associée à l'apparition d'une maladie clinique.



- L'OMS a publié une note d'information (DON – Disease Outbreak News) concernant le premier cas humain confirmé de virus Shamonda en **France** ; aucun autre cas humain n'a été détecté, et l'OMS considère que le risque pour la santé publique demeure incertain, compte tenu du peu de données disponibles sur le potentiel zoonotique du virus Shamonda — *Pour en savoir plus*




Maladie hémorragique épizootique

- **L'Espagne** a confirmé trois foyers de maladie hémorragique épizootique de sérotype 7 dans des élevages bovins situés à **Cadix**, **Badajoz** et **Ciudad Real** ; il s'agit de la première détection de ce sérotype en Espagne et au sein de l'Union européenne — *Pour en savoir plus*



Rage


- Le **Québec** a confirmé le premier cas de rage du raton laveur chez une vache depuis le début de l'épizootie en 2024; il s'agit d'une jeune génisse non vaccinée qui se trouvait dans un pâturage à **Coaticook**, dans les **Cantons-de-l'Est** — *Pour en savoir plus*



RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 2 novembre 2026 au 8 novembre 2026

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



- **Maladie hémorragique épizootique, sérotype 7, en Espagne**

  Agent pathogène : virus; **Transmission** : vecteur - *culicoides* ; **Espèces concernées :** bétail

  ⓘ L'Espagne a confirmé trois foyers de maladie hémorragique épizootique de sérotype 7 dans des élevages bovins situés à Cadix, Badajoz et Ciudad Real ; il s'agit de la première détection de ce sérotype en Espagne et au sein de l'Union européenne. Les bovins touchés présentaient de la fièvre ainsi que des lésions des muqueuses. Jusqu'à présent, seul le sérotype 8 circulait en Espagne ; bien que deux vaccins contre ce sérotype 8 soient disponibles depuis 2024, ils sont inefficaces contre le sérotype 7. Les mouvements de bétail au sein de l'Espagne continentale restent autorisés pour les animaux ne présentant aucun signe clinique. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	3 - 4

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 2 novembre 2026 au 8 novembre 2026

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord — **Nombre de signaux : 12** — **Nombre de semaines dans le rapport : 242** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,3**

• Au cours de la semaine dernière, le Canada a confirmé des foyers d'IAHP dans des élevages de volailles commerciaux en Colombie-Britannique (1) et au Québec (1) ; dans des élevages de volailles non commerciaux en Alberta (2) ; ainsi que chez des oiseaux non classés comme volailles (non commerciaux) en Alberta (1). Il s'agit des premières détections de la vague automnale au Québec et en Colombie-Britannique

• Au cours de la semaine dernière, l'USDA a signalé des foyers d'IAHP dans des élevages de volailles commerciaux en Oregon (1), dans le Dakota du Sud (1) et dans l'État de Washington (1) ; dans des élevages de volailles en Californie (1) et en Idaho (1) ; ainsi que chez des oiseaux non classés comme volailles en Californie (2)

• La Caroline du Sud a confirmé la présence de l'IAHP au sein de populations d'oiseaux sauvages, à la suite du signalement de plusieurs oiseaux morts près de Quarterman's Pond, à North Charleston

• En date du 9 novembre 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1230 troupeaux laitiers répartis dans 20 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Indiana(2), Oklahoma (2), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Utah (29), Michigan (31), Washington (43), Texas (43), Colorado (64), Idaho (177) et Californie (773); nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine écoulée, dans les États suivants : Washington (3) et Texas (2)

• Une mise à jour de l'USDA indique que le séquençage du génome entier confirme la présence du génotype B3.13 du virus H5N1 chez des bovins laitiers dans l'État de Washington ; des éléments suggèrent une introduction depuis l'Idaho, liée aux déplacements de bétail.

• Le Mexique a confirmé son premier foyer d'IAHP H5N1 depuis mai 2024, au sein d'un élevage commercial comptant 225 860 poules pondeuses, situé à Umán, dans l'État du Yucatán

• Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford

Rage au Canada — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 19** — **Évaluation moyenne : 3,0**

• Le Québec a confirmé le premier cas de rage du raton laveur chez une vache depuis le début de l'épizootie en 2024; il s'agit d'une jeune génisse non vaccinée qui se trouvait dans un pâturage à Coaticook, dans les Cantons-de-l'Est

Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis — **Nombre de signaux : 09** — **Nombre de semaines dans le rapport : 22** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,0**

• Au 9 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 124 cas de MCH chez des animaux dans trois États : le Texas (79), le Nouveau-Mexique (40) et l'Arizona (5). Le Texas a signalé son cas le plus septentrional à ce jour chez des bovins, dans le comté de Mitchell, ainsi qu'un second cas chez la faune sauvage (un wapiti)

• L'université Texas A&M lance un projet de génomique à grande échelle sur la MCH, visant à mieux comprendre la génétique du parasite (y compris les marqueurs génétiques associés à la résistance aux médicaments) et à faciliter la détection et le suivi des foyers d'infestation

• L'université de Californie à Davis a obtenu un financement de l'USDA pour développer un système d'alerte précoce concernant la MCH au sein de la faune sauvage en Californie, en Arizona, au Nouveau-Mexique, au Texas et en Floride. Ce système s'appuiera sur des outils de surveillance avancés et des modèles prédictifs afin d'améliorer la détection précoce et de suivre la propagation du parasite

• La FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence pour les comprimés à croquer Bravecto (fluralaner), destinés au traitement des infestations par la MCH chez les chiens et les chiots

Stomatite vésiculeuse aux États-Unis — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 26** — **Évaluation moyenne : 2,8**

• L'USDA a confirmé un nouveau foyer de stomatite vésiculaire dans un établissement équin du comté de Mesa, dans le Colorado, et a signalé un cas supplémentaire suspecté dans le comté de Delta

Virus de la maladie de Newcastle au Brésil — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 03** — **Évaluation moyenne : 2,7**

• Le Brésil a confirmé un quatrième foyer de maladie de Newcastle dans un élevage avicole situé à Nova Erechim, dans l'État de Santa Catarina (le deuxième plus grand État producteur de volailles du pays) ; cette détection a eu lieu dans le cadre d'opérations de surveillance menées par les équipes de défense sanitaire agricole de la région

Virus Shamonda en Europe — **Nombre de signaux : 04** — **Nombre de semaines dans le rapport : 15** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,7**

• L'Italie a rapporté la présence du SHAV chez des moucherons du genre *Culicoides* capturés à proximité d'élevages dans la province de Campanie ; des cas supplémentaires ont également été signalés chez des bovins et des buffles, et des foyers sont désormais recensés dans 5 provinces

• L'Espagne a confirmé un premier cas de SHAV-EU2 dans un élevage bovin au Pays basque ; au total, 9 provinces espagnoles sont touchées par le SHAV, les souches SHAV-EU1 et SHAV-EU2 ayant toutes deux été identifiées dans le pays

• L'Irlande a fait état de cas suspects ou confirmés de SHAV au sein de troupeaux bovins dans 5 comtés différents

• La France a confirmé des foyers de SHAV-EU dans 58 départements, touchant des bovins dans 54 départements, des ovins dans 3 départements, un équidé dans 1 département et un caprin dans 1 département

Ebola (virus Bundibugyo) en Afrique de l'Est (RDC, Kenya, Nigeria) — **Nombre de signaux : 04** — **Nombre de semaines dans le rapport : 18** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5**

• Au 5 novembre 2026, la RDC a notifié un total de 10 741 cas confirmés d'Ebola, dont 5 230 décès liés dans huit provinces : Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Haut-Uélé, Bas-Uélé, Sud Ubangi et Nord Ubangi

Influenza aviaire hautement pathogène en Europe — **Nombre de signaux : 06** — **Nombre de semaines dans le rapport : 290** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• À travers l'Europe, l'IAHP H5N1 a été signalée chez des oiseaux sauvages en Autriche, en Belgique, en Allemagne, au Danemark, en Estonie, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas et en Norvège ; l'IAHP H5N5 a également été détectée dans un foyer chez des oiseaux sauvages en Allemagne, tandis que des foyers d'IAHP H5N1 ont été rapportés dans des élevages de volailles en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni

• La France, le Danemark et l'Allemagne ont récemment relevé leurs niveaux de risque concernant l'IAHP

Influenza aviaire hautement pathogène en Asie — **Nombre de signaux : 03** — **Nombre de semaines dans le rapport : 252** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• La Corée du Sud a confirmé la présence du virus d'IAHP H5N9 dans un élevage de poules pondeuses situé à Yeoncheon, dans la province de Gyeonggi ; cette découverte a entraîné l'abattage de 90 986 volailles.

• La Corée du Sud a également détecté le virus de l'IAHP H5N1 chez un léopard sauvage retrouvé mort près du lac Ganwol, à Seosan, dans la province de Chungcheong du Sud

Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 21** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• Au 9 novembre 2026, l'Australie a confirmé 738 cas d'IAHP de sous-type H5 chez la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 342 en Australie-Méridionale, 81 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 249 dans l'État de Victoria, 53 en Tasmanie et 1 dans d'autres territoires (baie de Jervis)

• La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 2 novembre 2026 au 8 novembre 2026

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Peste porcine africaine

- *"Monitoring wild pig carcass persistence and contact rates to enhance African swine fever preparedness in Canada"* Pour en savoir plus
- *"Quantifying truck-mediated transmission risk during African swine fever movement restrictions in commercial swine farms"* Pour en savoir plus
- *"Genome sequencing reveals a highly divergent genotype II African swine fever virus in Nigeria"* Pour en savoir plus

Fièvre aphteuse

- *"Epidemiology of recent outbreaks of Foot-and-mouth-disease in cattle and emergence of SEA/Mya-98 topotype in Bangladesh"* Pour en savoir plus
- *"Detection of the EAST AFRICA-2 topotype of serotype O foot-and-mouth disease virus in Ethiopia provides evidence of changing epidemiology in the Horn of Africa"* Pour en savoir plus

Influenza

- *"Serologic Evidence of Avian Influenza Virus Exposure in Livestock, Egypt, 2024–2026"* Pour en savoir plus
- Pre-impression : *"H5N5 virus transmission is driven by repeated cross-Atlantic introductions and transmission among high latitude seabirds"* Pour en savoir plus
- *"Highly pathogenic H5N1 avian influenza infection and exposure in waterfowl and waterbirds of the Sacramento National Wildlife Refuge Complex, 2022-2025"* Pour en savoir plus
- *"Genetic Characterization of Avian Influenza H14 Viruses in Guangdong, China: Evidence of Intercontinental Transmission and Reassortment in the East Asian–Australasian Flyway"* Pour en savoir plus
- *"Influenza A Virus at the Exhibition Swine-Human Interface in the USA"* Pour en savoir plus
- *"Large-Scale Genomic Surveillance of Swine Influenza A Viruses in Europe Highlights Increased Reassortment Potential and Field-Based Associations With Clinical Manifestations"* Pour en savoir plus

Myiase a Cochliomyia hominivorax

- *"Biosecurity on Pig Farms Against New World Screwworm: Strategies to Prevent Its Introduction and Spread"* Pour en savoir plus

Virus Shamonda

- Pre-impression: *"An Emerging Viral Infection in Horses in Central Europe: Suspected Shamonda Virus Seroconversion in Asymptomatic Horses in Baden-Württemberg from June to September 2026"* Pour en savoir plus
- WHO DON: Virus Shamonda chez l'humain – France Pour en savoir plus

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- "Detection of vector-borne infections in nondomestic mammals at a single zoological institution" Pour en savoir plus
- Pre-impression: *"The ecological niche and seasonality of Theileria equi in Portugal"* Pour en savoir plus
- *"Preliminary Study on Inferring for the Invasive Pathway of Lumpy Skin Disease Vector, Stomoxys calcitrans (Diptera, Muscidae) in South Korea"* Pour en savoir plus

Autres

- *"Genomic analysis of early case samples from the 2025 Marburg virus outbreak in Ethiopia"* Pour en savoir plus
- Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 11/05/2026 Pour en savoir plus
- France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoosanitaire internationale 010/11/2026 Pour en savoir plus
- Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers Pour en savoir plus
- Rapport de surveillance mondiale des maladies du SHIC – Novembre 2026 Pour en savoir plus
- Rapport de surveillance nationale des maladies du SHIC – Novembre 2026 Pour en savoir plus

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.