


SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Fièvre aphteuse

- La Grèce a signalé la présence de la fièvre aphteuse, dont la dernière apparition remontait à août 1994. Cinq foyers de fièvre aphteuse de souche SAT-1 ont été signalés sur l'île de Lesbos

Pour en savoir plus



NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



Fièvre aphteuse SAT-1 en Grèce

Agent pathogène : virus; **Transmission :** contact direct, fomit; **Espèces concernées :** moutons, bétail

① La Grèce a signalé la présence de la fièvre aphteuse, dont le dernier cas remontait à août 1994. Cinq foyers de fièvre aphteuse de souche SAT-1 ont été recensés sur l'île de Lesbos, située au large des côtes turques, qui a connu une importante propagation de cette souche au cours de l'année écoulée. Au total, 92 cas ont été signalés chez les ovins et les bovins de l'île, et 1 535 animaux ont été identifiés comme sensibles.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	3,0 - 3,3
Nombre de signaux	3
Nombre de notations	4

Maladies bovines à Novossibirsk, en Russie

Agent pathogène : incertain; **Transmission :** incertain; **Espèces concernées :** bétail

① La région de Novossibirsk, en Sibérie (Russie), a décrété l'état d'urgence face à une épidémie de fièvre aphteuse, après plusieurs semaines d'abattages massifs qui ont provoqué la colère des petits éleveurs, lesquels estiment que ces mesures menacent leurs moyens de subsistance. Les autorités évoquent des cas de pasteurellose ou de rage, mais certains éleveurs et scientifiques remettent en question le diagnostic et la nécessité de ces abattages massifs, soulignant que la pasteurellose se soigne généralement par antibiotiques et ne requiert pas habituellement d'abattage de masse. Les médias russes ont également fait état de foyers similaires dans les régions limitrophes de Novossibirsk, notamment en République de l'Altaï. Conformément à la réglementation de l'OMS, la pasteurellose n'est pas soumise à déclaration obligatoire. Des sources locales et des contacts commerciaux laissent entendre que l'ampleur de ces mesures pourrait indiquer un foyer de fièvre aphteuse non confirmé, les autorités ayant suspendu les exportations de bétail et de produits dérivés en provenance des régions touchées.

Pour en savoir plus

Évaluation moyenne	2,5 - 2,8
Nombre de signaux	3
Nombre de notations	4 - 5

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Grippe aviaire hautement pathogène en

Nombre de signaux : 07

Nombre de semaines dans le rapport : 209

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8

Amérique du Nord

- Le [Canada](#) n'a signalé aucun foyer d'IAHP au cours de la dernière semaine
- Au cours de la semaine dernière, l'[USDA](#) a signalé des foyers d'IAHP dans la volaille commerciale dans : l'Indiana(7) et la Pennsylvanie(1) ; dans des troupeaux avicoles dans : l'Indiana(3) ; et dans des troupeaux non-avicoles dans : l'Ohio(1), Washington(1), l'Utah(1) et la Virginie-Occidentale(1)
- Au 23 mars 2026, l'[USDA](#) avait signalé la grippe A (H5N1) dans 1 088 troupeaux laitiers répartis dans 19 États : Wisconsin(1), Nebraska(1), Wyoming(1), Caroline du Nord(1), Ohio(1), Oklahoma(2), Kansas(4), Arizona(5), Dakota du Sud(7), [Minnesota](#)(9), Nouveau-Mexique(9), Nevada(11), Iowa(13), Utah(13), Texas(30), [Michigan](#)(31), [Colorado](#)(64), Idaho(112) et Californie(773) ; aucun nouveau foyer n'a été signalé au cours des douze dernières semaines
- D'autres animaux ont été testés positifs au virus HPAI H5N1 au parc d'État d'Ano Nuevo, dans le comté de San Mateo, en [Californie](#), portant le nombre total d'animaux confirmés à 30 (27 éléphants de mer du Nord, 2 otaries de Californie et 1 loutre de mer du Sud) ; au 5 mars, les éléphants de mer qui se reproduisent dans la région de Piedras Blancas, à [San Simeon](#), n'étaient pas touchés
- Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour la grippe sont disponibles sur le site [WastewaterSCAN](#) du [CDC](#) et de l'Université de Stanford

Fièvre aphteuse en Asie

Nombre de signaux : 05

Nombre de semaines dans le rapport : 18

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5

- [Chypre](#) a signalé de nouveaux foyers de fièvre aphteuse de souche SAT-1, portant le nombre total de foyers à 46. 98 % du cheptel bovin touché a été vacciné et environ 23 000 ovins et caprins ont été abattus afin de contenir l'épidémie
- Des scientifiques [chypriotes](#) alertent sur le risque important que représente la fièvre aphteuse pour la petite race bovine autochtone de l'île. Ils exhortent les autorités à privilégier la vaccination et à éviter les abattages massifs qui pourraient entraîner une perte génétique irréversible et menacer la survie de la race
- [Israël](#) a signalé des cas de fièvre aphteuse de souche SAT-1 chez 20 bovins trouvés près des réserves naturelles de Nahal Tavor et d'Yissachar, en Basse Galilée. Des cas de transmission à la faune sauvage ont été constatés, notamment deux décès de gazelles des montagnes

Maladie de Newcastle en Europe

Nombre de signaux : 02

Nombre de semaines dans le rapport : 06

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5

- [L'Allemagne](#) a signalé neuf nouveaux foyers de maladie de Newcastle (MN) chez les volailles domestiques dans le Brandebourg
- La [Pologne](#) a signalé deux nouveaux foyers de maladie de Newcastle (MN) chez les volailles domestiques

Grippe aviaire hautement pathogène en Europe

Nombre de signaux : 11

Nombre de semaines dans le rapport : 266

Évaluation moyenne : 2,0 - 2,2

- La [France](#), la [Pologne](#), les [Pays-Bas](#) et la [République tchèque](#) ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques
- [L'Angleterre](#), [l'Irlande](#), la [France](#), le [Monténégro](#), [l'Allemagne](#), la [Pologne](#) et [l'Estonie](#) ont signalé des cas d'IAHP chez les oiseaux sauvages
- Un résumé de la situation générale de l'IAHP en Europe est disponible [ici](#)

Grippe aviaire hautement pathogène en

Nombre de signaux : 05

Nombre de semaines dans le rapport : 110

Évaluation moyenne : 2,0

Amérique du Sud

- Le [Chili](#), le [Pérou](#) et [l'Argentine](#) ont signalé des foyers d'IAHP chez les oiseaux de basse-cour

Grippe aviaire hautement pathogène en Asie

Nombre de signaux : 02

Nombre de semaines dans le rapport : 230

Évaluation moyenne : 2,0

- La [Corée du Sud](#), [Taïwan](#), le [Népal](#) et [l'Inde](#) ont signalé des foyers d'IAHP chez les volailles domestiques

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Coronavirus

- ◆ *“Human MERS-CoV cases are falling but pose an ongoing pandemic threat”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Will animal reservoirs give us the next SARS-CoV-2 variant?”* [Pour en savoir plus](#)

Grippe

- ◆ OFFLU - Au-delà de la volaille : repenser la surveillance et le contrôle de l’IAHP H5Nx en anticipant les risques de transmission aux mammifères [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“First report of serological and molecular detection of influenza A (H1N1) in European bison (Bison bonasus)”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Clade 2.3.4.4b H5N1 influenza A virus exhibits high infectivity in human respiratory tract models”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“High pathogenicity avian influenza in pinniped conservation”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ *“Emergence of a novel H4N6 avian influenza virus with mammalian adaptation isolated from migratory birds in Zhejiang Province, China, 2024”* [Pour en savoir plus](#)

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- ◆ OPS - Alerte épidémiologique : Fièvre jaune dans la région des Amériques - 13 mars 2026 [Pour en savoir plus](#)

Autres

- ◆ Pré-impression : *“Mapping global emergence of pathogens with epidemic and pandemic potential to inform and accelerate pandemic prevention, preparedness, readiness and response”* [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Rapport d'actualité sur la santé mondiale de New York – 03/19/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoonitaire internationale 24/03/2026 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ ECDC - Rapport sur les menaces de maladies transmissibles, 14 – 20 mars 2026, semaine 12 [Pour en savoir plus](#)
- ◆ Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers [Pour en savoir plus](#)

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIW, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.