
RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 26 octobre 2026 au 1 novembre 2026

SOMMAIRE : ÉVÉNEMENTS (tous les éléments évalués ≥ 3,0)


Myiase a Cochliomyia hominivorax

- L'USDA a confirmé la première détection de la MCH en **Arizona**, chez un chien dans le comté de **Cochise** — *Pour en savoir plus*
- Au 2 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 90 cas de MCH chez des animaux dans trois États : le **Texas** (66), le **Nouveau-Mexique** (23) et **l'Arizona** (1) ; par ailleurs, quatre détections supplémentaires dans des pièges à mouches ont également été signalées au **Texas** (3) et au Nouveau-Mexique (1). — *Pour en savoir plus*




Influenza aviaire hautement pathogène

- L'USDA a confirmé la présence d'IAHP H5N1 dans 13 troupeaux bovins laitiers supplémentaires dans **l'État de Washington**, portant le nombre total de troupeaux infectés à 40 — *Pour en savoir plus*
- L'USDA a confirmé le premier cas d'IAHP H5N1, génotype B3.13, chez des bovins laitiers dans **l'Indiana** — *Pour en savoir plus*
- L'USDA a également confirmé la présence de l'IAHP H5N1 chez des bovins laitiers dans le comté de **Weld**, au **Colorado** ; il s'agit de la première détection depuis août 2024 — *Pour en savoir plus*
- Au cours de la semaine dernière, le **Canada** a confirmé des foyers d'IAHP dans des élevages avicoles commerciaux en **Alberta** (2) et au **Manitoba** (1), ainsi que dans des élevages non commerciaux (autres que des volailles) en **Ontario** (1) — *Pour en savoir plus*




Influenza de type A(H5N1)

- Le comté de **Yakima**, dans **l'État de Washington**, a signalé son deuxième et troisième cas humain de grippe A(H5N1) liés à une exposition à des bovins laitiers infectés ; le deuxième cas, qui a développé une forme grave de la maladie et présentait des problèmes de santé préexistants, est décédé, tandis que le troisième cas n'a pas présenté de forme grave de la maladie et n'a pas nécessité d'hospitalisation — *Pour en savoir plus*




Virus de la maladie hémorragique du lapin

- Les **Territoires du Nord-Ouest** ont confirmé, pour la première fois, la présence du virus de la maladie hémorragique du lapin chez des lièvres d'Amérique retrouvés morts sur le territoire. Il y a eu de nombreux signalements de décès inexpliqués parmi ces animaux dans les régions du **Dehcho** et du **South Slave** cet automne. — *Pour en savoir plus*



Virus Shamonda-Europe


- Le **Royaume-Uni** a confirmé ses premières détections de SHAV-EU dans deux exploitations laitières : l'une située dans le **Powys**, au **pays de Galles** (SHAV-EU2), et l'autre dans le **Shropshire**, en **Angleterre** (variante non précisée) — *Pour en savoir plus*



RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 26 octobre 2026 au 1 novembre 2026

NOUVEAUX ÉVÉNEMENTS : (événements évalués > 2)



Virus Shamonda Europe au Royaume-Uni

Agent pathogène : virus; **Transmission** : vecteur - *culicoides* ; **Espèces concernées :** bétail

ⓘ Le Royaume-Uni a signalé ses premières détections de SHAV-EU chez des animaux d'élevage, avec des cas confirmés par PCR chez des bovins dans deux exploitations laitières : l'une située dans le Powys, au pays de Galles, et l'autre dans le Shropshire, en Angleterre. Environ 15 bovins ont été touchés, présentant des signes cliniques tels que diarrhée, fièvre, diminution de la rumination, abattement et baisse de la production laitière ; deux décès sont survenus dans l'exploitation galloise, bien que la présence concomitante d'une autre maladie ne puisse être exclue. Le séquençage a permis d'identifier le sous-type SHAV-EU2 au pays de Galles, tandis que le variant présent en Angleterre n'a pas pu être déterminé en raison d'une faible charge virale. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	4

Virus de la maladie hémorragique du lapin dans les Territoires du Nord-Ouest

Agent pathogène : virus ; **Transmission** : contact direct, fomit ; **Espèces concernées :** lièvre d'Amérique

ⓘ Les Territoires du Nord-Ouest ont confirmé, pour la première fois, la présence du virus de la maladie hémorragique du lapin chez des lièvres d'Amérique sauvages, à la suite de nombreux signalements de lièvres morts dans les régions du Dehcho et de South Slave cet automne. L'examen des spécimens touchés a révélé une hypertrophie de la rate et du foie, ainsi que des lésions au niveau du cœur et des poumons ; il a été rapporté certains lièvres semblaient en bonne santé avant de mourir subitement. Les autorités territoriales suivent de près cette épidémie, alors que des mortalités massives de lièvres ont également été signalées dans le nord de l'Alberta et en Colombie-Britannique. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	3,0
Nombre de signaux	1
Nombre de notations	3

Virus de la fièvre catarrhale du mouton, sérotype 3, en Lettonie

Agent pathogène : virus ; **Transmission** : vecteur ; **Espèces concernées :** bétail

ⓘ La Lettonie a signalé son premier cas de FCM-3, détecté dans deux échantillons prélevés dans le cadre d'une surveillance active au sein d'un élevage bovin comptant 12 vaches laitières, situé dans la commune de Medze (district de Dienvidkurzeme), dans le sud-ouest de la Lettonie. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	2,8
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	4

Fièvre aphteuse (sérotype présumé nouveau, possiblement SAT-1) en Algérie

Agent pathogène : virus ; **Transmission** : contact direct, aérosol, fomit ; **Espèces concernées :** bétail

ⓘ L'Algérie a temporairement suspendu les importations de bovins vivants, suite au signalement de l'émergence d'un nouveau sérotype du virus de la fièvre aphteuse (possiblement le SAT-1). Le pays a rapporté des foyers de fièvre aphteuse dans les provinces de Jijel et de Sétif, ce qui a entraîné la fermeture des marchés de bétail et un renforcement des restrictions sur les déplacements des animaux. Plus tôt cette année, en janvier, l'Algérie avait signalé deux foyers dus au sérotype O chez des bovins dans la province d'El Oued. *Pour en savoir plus*

Évaluation moyenne	2,0 - 2,3
Nombre de signaux	2
Nombre de notations	3 - 4

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 26 octobre 2026 au 1 novembre 2026

ÉVÉNEMENTS CONTINUS : (événements évalués ≥ 2,4)

Influenza aviaire hautement pathogène en Amérique du Nord — **Nombre de signaux : 18** — **Nombre de semaines dans le rapport : 241** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,3**

• Au cours de la semaine dernière, le Canada a signalé des foyers d'IAHP dans des élevages avicoles commerciaux en Alberta (2) et au Manitoba (1), ainsi que dans des élevages non commerciaux (autres que des volailles) en Ontario (1)
• La Colombie-Britannique a instauré une obligation de déclaration pour les bovins en provenance de l'État de Washington, en raison des préoccupations liées à l'épizootie d'IAHP H5N1 qui sévit actuellement dans les élevages laitiers aux États-Unis
• Au cours de la semaine dernière, l'USDA a signalé des foyers d'IAHP dans des élevages avicoles commerciaux au Minnesota (1), en Californie (1) et en Iowa (1), ainsi que chez des troupeaux non-avicoles en Californie (2), dans l'État de Washington (1), au Wyoming (1) et en Arkansas (1)
• De nombreux oiseaux sauvages malades ou morts ont été signalés récemment dans l'ouest de l'État de Washington, ce qui indique une résurgence de l'IAHP associée à la migration automnale des oiseaux
• Le génotype D1.1 du virus de l'IAHP H5N1 a été détecté dans des eaux usées à Kauai ; il s'agit de la première détection de ce génotype à Hawaï. La source demeure inconnue
• En date du 2 novembre 2026, l'USDA avait signalé l'influenza A (H5N1) dans 1224 troupeaux laitiers répartis dans 20 États : Wisconsin (1), Nebraska (1), Wyoming (1), Caroline du Nord (1), Ohio (1), Indiana(2), Oklahoma (2), Kansas (5), Arizona (5), Dakota du Sud (7), Minnesota (9), Nouveau-Mexique (9), Nevada (11), Iowa (13), Washington (40), Utah (29), Michigan (31), Texas (41), Colorado (64), Idaho (177) et Californie (773); nouveaux foyers ont été signalés au cours de la semaine écoulée, dans les États suivants : Washington (13) et Indiana (2)
• L'USDA a confirmé le premier cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N1, génotype B3.13, chez des bovins laitiers dans l'Indiana
• L'USDA a également confirmé la présence d'IAHP H5N1 chez des bovins laitiers dans le comté de Weld, dans le Colorado ; il s'agit de la première détection depuis août 2024
• Des tableaux de bord de surveillance des eaux usées pour l'influenza sont disponibles sur le site WastewaterSCAN du CDC et de l'Université de Stanford

Myiase à Cochliomyia hominivorax aux États-Unis — **Nombre de signaux : 04** — **Nombre de semaines dans le rapport : 21** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 3,3**

• Au 2 novembre 2026, l'USDA a confirmé un total de 90 cas de MCH dans trois États : le Texas (66), le Nouveau-Mexique (23) et l'Arizona (1) ; par ailleurs, quatre détections supplémentaires ont été signalées grâce à des pièges à mouches, au Texas (3) et au Nouveau-Mexique (1)
• L'USDA a confirmé la première détection de MCH en Arizona, chez un chien dans le comté de Cochise
• Le point d'entrée de Mariposa, à Nogales (Arizona), rouvrira aux importations de bovins en provenance du Mexique le 30 novembre 2026, après une fermeture de 14 mois motivée par des préoccupations liées à la présence de MCH

Influenza de type A(H5N1) aux États-Unis — **Nombre de signaux : 02** — **Nombre de semaines dans le rapport : 48** — **Évaluation moyenne : 3,0**

• Le comté de Yakima, dans l'État de Washington, a signalé son deuxième et troisième cas humains de grippe A(H5N1) liés à une exposition à des bovins laitiers infectés ; le deuxième cas, qui a développé une forme grave de la maladie et présentait des problèmes de santé préexistants, est décédé, tandis que le troisième cas n'a pas présenté de forme grave de la maladie et n'a pas nécessité d'hospitalisation

Virus de la maladie de Newcastle au Brésil — **Nombre de signaux : 03** — **Nombre de semaines dans le rapport : 02** — **Évaluation moyenne : 2,8**

• Le Brésil a confirmé un troisième foyer de maladie de Newcastle dans un élevage avicole, dans le cadre d'une surveillance renforcée au sein d'une zone d'urgence sanitaire déjà établie à Nova Erechim, dans l'État de Santa Catarina (deuxième État producteur de volailles du pays), à proximité des deux autres foyers

Virus Shamonda en Europe — **Nombre de signaux : 03** — **Nombre de semaines dans le rapport : 14** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,8**

• La France a confirmé des foyers de SHAV-EU dans 56 départements, touchant des bovins dans 53 départements, des ovins dans 2 départements, un équidé dans 1 département et un caprin (dans un premier département, le Var)

Tuberculose bovine aux États-Unis — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 14** — **Évaluation moyenne : 2,5**

• Le Michigan a confirmé la présence de tuberculose bovine dans un troupeau de bovins du comté d'Alcona, situé dans la zone accréditée modifiée du Michigan, grâce à la surveillance annuelle de routine de l'ensemble du troupeau

Ebola (virus Bundibugyo) en Afrique de l'Est (RDC, Kenya, Nigeria) — **Nombre de signaux : 06** — **Nombre de semaines dans le rapport : 17** — **Évaluation moyenne : 2,0 - 2,5**

• Au 29 octobre 2026, la RDC a notifié un total de 10 274 cas confirmés d'Ebola, dont 4 992 décès liés dans huit provinces : Ituri, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo, Haut-Uélé, Bas-Uélé, Sud-Ubangi et Nord-Ubangi
• Au 26 octobre 2026, le cas nigérian d'Ebola, impliquant un voyageur ayant récemment voyagé en Ouganda, avait été évacué médicalement vers la Suisse ; 62 contacts étaient suivis au 29 octobre

Influenza aviaire hautement pathogène en Europe — **Nombre de signaux : 05** — **Nombre de semaines dans le rapport : 289** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• À travers l'Europe, d'IAHP H5N1 a été signalée chez des oiseaux sauvages en Allemagne, en Estonie, en Italie, en Lituanie, en Lettonie, aux Pays-Bas, en Roumanie et en Norvège ; le sous-type H5 (non typé) a été détecté chez des oiseaux sauvages en Lettonie ; le sous-type H5N5, chez un oiseau sauvage en Norvège ; le sous-type H5N1, chez des volailles en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas ; et le sous-type H5N1, chez un oiseau en captivité en Allemagne

Influenza aviaire hautement pathogène en Asie — **Nombre de signaux : 06** — **Nombre de semaines dans le rapport : 251** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• Le Japon a signalé un résultat préliminaire positif pour d'IAHP chez une oie sauvage retrouvée morte dans la préfecture de Miyagi
• Taïwan a signalé un foyer d'IAHP H5N1 parmi des oies d'élevage dans la ville de Taoyuan
• Le Vietnam a signalé un foyer d'IAHP H5N6 au sein d'un élevage de canards dans la province de Dong Thap
• La Corée du Sud a détecté le virus de l'IAHP H5N1 dans des fientes d'oiseaux sauvages collectées près de Gimpo ; il s'agit de la deuxième détection de ce type chez des oiseaux sauvages dans le pays cette année

Influenza aviaire hautement pathogène en Océanie — **Nombre de signaux : 01** — **Nombre de semaines dans le rapport : 20** — **Évaluation moyenne : 2,0**

• Au 2 novembre 2026, l'Australie a confirmé 732 cas d'IAHP H5 chez la faune sauvage : 10 en Australie-Occidentale, 341 en Australie-Méridionale, 76 en Nouvelle-Galles du Sud, 2 dans le Queensland, 249 dans l'État de Victoria, 53 en Tasmanie et 1 dans la baie de Jervis
• L'IAHP H5 a été confirmée chez un dauphin commun retrouvé mort à Encounter Bay, en Australie-Méridionale
• La Nouvelle-Zélande n'a signalé aucune nouvelle détection d'IAHP au cours de la semaine écoulée

RAPPORT DE RENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

Du 26 octobre 2026 au 1 novembre 2026

CONCLUSIONS SCIENTIFIQUES ET RAPPORTS :

Coronavirus

- *"Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Camels, Kazakhstan, 2025"* Pour en savoir plus
- *"SARS-CoV-2 Establishment and Spread in White-Tailed Deer in a Chronic Wasting Disease Management Area"* Pour en savoir plus

Fièvre aphteuse

- *"Within-Host Evolution of Foot-and-Mouth Disease Virus From Persistently Infected Cattle and Buffaloes in Vietnam"* Pour en savoir plus
- FAO – Stratégie de prévention et de lutte contre la fièvre aphteuse : Feuille de route régionale pour le Proche-Orient 2026–2030 Pour en savoir plus

Influenza

- Pre-impression : *"Dairy cattle movement networks govern the spread and persistence of H5N1 B3.13 in the United States"* Pour en savoir plus
- *"Variable transmission efficiency of mammalian origin HPAI D1.1 H5N1 strains in ferrets"* Pour en savoir plus
- *"Contact transmission of fur seal-derived genotype A3 influenza A(H5N1) virus in ferrets"* Pour en savoir plus
- *"Detection and Isolation of H5N1 Clade 2.3.4.4b High Pathogenicity Avian Influenza Virus from Ticks (Ornithodoros maritimus) Recovered from a Naturally Infected Slender-Billed Gull (Chroicocephalus genei)"* Pour en savoir plus
- *"Co-circulation of H5N1 and H5N6 high pathogenicity avian influenza viruses in migratory birds at a coastal wintering site in China"* Pour en savoir plus
- *"From mapping to prediction: A systematic review and critical appraisal of methodological approaches to assessing avian influenza incursion risk in domestic poultry"* Pour en savoir plus
- *"RAVEN: a foundation model-based approach for predicting avian influenza outbreak risk with multi-source geospatial data"* Pour en savoir plus

Myiase a Cochliomyia hominivorax

- *"Evaluation of the therapeutic efficacy of fluralaner chewable tablets (Bravecto®) against New World screwworm (Cochliomyia hominivorax) infestation in dogs"* Pour en savoir plus

Vecteurs et maladies à transmission vectorielle

- *"Discovery of the relapsing fever tick (Ornithodoros turicata americanus Marx) (Acari: Argasidae) in Georgia, USA"* Pour en savoir plus
- *"Spatio-temporal machine learning for multi-horizon prediction of bluetongue outbreaks"* Pour en savoir plus
- *"Epidemiological status of equine piroplasmosis in Menorca (Spain): serological, molecular survey and associated factors"* Pour en savoir plus

Autres

- Pre-impression : *"Why Americans Choose Raw Milk: Evidence from a National Quantitative Survey"* Pour en savoir plus
- Évaluation du foyer de maladie de Newcastle (MN) en Europe par le DEFRA Pour en savoir plus
- Rapport de mise à jour sur la santé mondiale à New York – 10/29/2026 Pour en savoir plus
- France - Bulletin hebdomadaire de surveillance zoosanitaire internationale 03/11/2026 Pour en savoir plus
- Système d'information sur les maladies animales de la Commission européenne – Résumé hebdomadaire des foyers Pour en savoir plus

Mise en garde

Le présent rapport de renseignement vise à fournir de l'information aux gestionnaires de risque au sujet des maladies émergentes et zoonotiques susceptibles de représenter une menace pour le Canada. Le rapport est fondé sur les signaux d'information acquis et sélectionnés à partir de 21 sources de surveillance des maladies par l'intermédiaire de KIWI, le Knowledge Integration using Web Based Intelligence (intégration des connaissances à l'aide de l'information Web) hébergé sur la plateforme informatique du Réseau canadien de renseignements sur la santé publique (RCRSP). Le rapport est fondé sur les activités de la communauté de pratique de la CMEZ et est susceptible de changer en fonction de l'évolution des besoins des utilisateurs.